TRAPPIT - POPIS PRODUKTU

Lepová past na štěnice je vhodná k monitoringu výskytu štěnic před i po dezinsekčním zásahu. Umožňuje monitorovat výskyt štěnic v jednotlivých pokojích, a je tak efektivním nástrojem ke stanovení potřeby dezinsekčního zásahu pomocí insekticidů nebo jeho opakování. Lepovou past je potřeba umisťovat co nejblíže k předpokládaným úkrytům štěnic. Jedná se o pasivní typ pasti i přes to, že obsahuje směs aktivních látek (kairomonů) nanesených pod vrstvu lepidla sloužící k nalákání štěnic. Zvýšit úspěšnost a přesnost monitoringu můžete použitím feromonových.

Past může být umístěna přímo pod postele a nábytek nebo v jejich těsné blízkosti v místech předpokládaného výskytu štěnic.

- Přibližné rozměry (před složením): 240 mm × 115 mm
- Přibližné rozměry (složená – připravena k použití): 95 mm × 100 mm × 25 mm
- Materiál: papír
- Barva: zelená a bílá
- Balení: v sadě 10 × 2 pasti

VÝHODY

- Diskrétní, efektivní a snadno použitelná
- Bez insekticidů
- Citlivý monitoring i při nízké infestaci
- Vhodná k detekci všech vývojových stádií štěnic (nymfy a dospělci)
- Štěnice jsou lákány směsí aktivních látek (kairomonů) nanesených pod vrstvu lepidla
- Přehledná tabulka na zadní straně pro evidenci data, umístění, čísla pokoje a počtu odchycených jedinců

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

1. Složit past dle návodu na její spodní straně a odstranit krycí papír chránící vrstvu lepidla.
2. Umístit lepové pasti na štěnice (nejlépe) v ložnici na podlahu hned u zdi pod čelem postele. Doporučují se 2 pasti pod každou postel. To umožní efektivní a diskrétní monitoring výskytu štěnic.
3. Lepové pasti by měly být v místnosti alespoň po dobu jednoho týdne. Na základě vyhodnocení monitoringu mohou být provedena další opatření.

Pokud není na lepové pasti zachycena žádná štěnice, neznamená to, že se v kontrolované místnosti nevyskytují.

Lepové pasti na štěnice jsou určeny jako jeden z nástrojů při boji proti štěnicím a mají pomoci při profesionálním a přesném zásahu proti tomuto hmyzu. **Nelze je použít k vyhubení štěnic!**

Lepovou past na štěnice je možné v neporušených obalech skladovat 2 roky od data výroby. **Pokud je past používána k nepřetržitému monitoringu, doporučuje se měnit každé 4 týdny.**